

# Anamnesebogen Zahnarztpraxis Ostap Elert

Name: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_ Geb.am: \_\_\_\_\_  
Anschrift: \_\_\_\_\_  
Tel.Nr.: \_\_\_\_\_ Handy: \_\_\_\_\_ Krankenkasse: \_\_\_\_\_  
Beruf: \_\_\_\_\_ Arbeitgeber: \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_

## Gesundheitsanamnese

### Herz/ Kreislauf

- Herzfehler
- Angina pectoris
- Herzinfarkt
- Herzmuskelentzündung
- Herzklappenentzündung
- künstliche Herzklappe
- Herzschrittmacher
- hoher Blutdruck
- niedriger Blutdruck
- Herzschwäche

oder \_\_\_\_\_

### Gefäße

- Schlaganfall
- Durchblutungsstörungen
- Krampfadern
- Thrombosen

oder \_\_\_\_\_

### Atemwege/ Lunge

- Asthma
- Lungenentzündung
- Tuberkulose
- chronische Bronchitis
- Schlafapnoe
- Schnarchen Sie?

oder \_\_\_\_\_

### Leber

- Gelbsucht
- Leberverhärtung
- Fettleber
- Gallensteine
- Hepatitis O A O B O C

oder \_\_\_\_\_

### Nieren

- Dialysepflichtigkeit
- Nierenentzündung
- Nierensteine

oder \_\_\_\_\_

### Magen, Darm

- Geschwür
- Verdauungsstörungen
- Refluxkrankheit

oder \_\_\_\_\_

### Stoffwechsel

- Diabetes mellitus Typ I
- Diabetes mellitus Typ II
- Schilddrüsenunterfunktion
- Schilddrüsenüberfunktion
- Kropf

oder \_\_\_\_\_

### Skelettsystem

- Gelenkerkrankungen
- Bandscheiben
- Rheuma
- Arthritis
- Osteoporose Erkrankung
- Fibromyalgie

oder \_\_\_\_\_

### Nerven

- Krampfanfälle ( Epilepsie)
- Lähmungen
- Depressionen
- Angstzustände

oder \_\_\_\_\_

### Augen

- Grüner Star
- Grauer Star
- Blindheit

### Blut

- Gerinnungsstörungen
- Nachbluten nach OP

oder \_\_\_\_\_

### Allergie

- Medikamente
- Latex
- Heuschnupfen

oder \_\_\_\_\_

### Immunschwäche

- Einnahme von Cortison
- Zustand nach Organtransplantation
- HIV / Aids

oder \_\_\_\_\_

### O Sind sie schwanger?

Welche Schwangerschaftswoche: \_\_\_\_\_

Wurden sie in der Vergangenheit mit **Bisphosphonaten** behandelt?

Welche Erkrankung? Präparat ? Wann?

\_\_\_\_\_

Andere Erkrankungen oder Behinderungen?

\_\_\_\_\_

Rauchen Sie ? O ja wie viele? \_\_\_\_ O nein

Trinken sie regelmäßig Alkohol ?

O ja O nein

### Blutverdünner ?

- ASS100  Clopidogrel  Marcumar
- Eliquis  Lixiana  Pradaxa
- Xarelto

Regelmäßige Medikamente die sie einnehmen

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Sind sie mit der Farbe und Form ihrer Zähne zufrieden? O ja

O nein \_\_\_\_\_

### Hausarzt :

\_\_\_\_\_

**Ich versichere, dass ich alle Angaben**  
entsprechend meinem eigenen  
Informationsstand gemacht habe

Datum \_\_\_\_\_

**Unterschrift** \_\_\_\_\_

## Aufklärung über die zahnärztliche Lokalanästhesie

Die zahnärztliche Lokalanästhesie (örtliche Betäubung) dient der lokalen Ausschaltung der Schmerzempfindung im Zahn-, Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich. Durch sie können die notwendigen Behandlungen (wie z.B. Füllungen, Wurzelbehandlungen, Extraktionen, Operationen) in der Regel schmerzfrei durchgeführt werden. Überwiegend wird diese Körperregion vom Nervus trigeminus (einem Hirnnerven) mit Gefühl versorgt. Um diesen zu betäuben, wird die Lokalanästhesielösung möglichst dicht an kleinere Nervenfasern (Infiltrationsanästhesie) in den Zahnhalteapparat und Kieferknochen (intraalveoläre Anästhesie) oder in die Nähe eines der drei Hauptäste des Nerven (Leitungsanästhesie) platziert. Obwohl die Lokalanästhesie ein sicheres Verfahren zur Schmerzausschaltung ist, sind Nebenwirkungen und Unverträglichkeiten der verwendeten Substanzen nicht unbedingt vermeidbar.

Ferner kann es unter anderem zu folgenden Komplikationen kommen:

**Hämatom (Bluterguss):** Durch Verletzung kleiner Blutgefäße können Blutungen in das umgebene Gewebe eintreten. Bei Einblutungen in einen der Kaumuskeln infolge der Injektion kann es zu einer Behinderung der Mundöffnung und Schmerzen, in ganz seltenen Fällen auch Infektionen kommen. Sie sollten Ihren Zahnarzt darüber informieren, damit eine geeignete Behandlung erfolgen kann. In der Regel kommt es zu einer vollständigen Wiederherstellung der Funktion.

**Nervenschädigung:** Bei der Leitungsanästhesie kann in sehr seltenen Fällen eine Irritation von Nervenfasern eintreten. Hierdurch sind vorübergehende bzw. dauerhafte Gefühlsstörungen möglich. Dies betrifft vor allem die Injektion im Unterkiefer, bei der die entsprechende Zungenhälfte oder Unterkiefer- oder Lippenregion betroffen sein kann. Eine spezielle Therapie gibt es derzeit nicht. Die spontane Heilung muss abgewartet werden.

Sollte das Taubheitsgefühl nicht nach max. 12 Std. vollständig abgeklungen sein, informieren sie ihren Zahnarzt.

**Verkehrstüchtigkeit:** Infolge der örtlichen Betäubung und der zahnärztlichen Behandlung kann es zu einer Beeinträchtigung der Reaktions- und Konzentrationsfähigkeit kommen. Diese ist primär nicht auf das Medikament, sondern vielmehr auf den Stress und die Angst im Rahmen der Behandlung sowie der lokalen Irritation zurückzuführen. Sie sollten daher während dieser Zeit nicht aktiv im Straßenverkehr teilnehmen.

**Selbstverletzung:** Sollten außer dem behandelten Zahn auch die umgebenden Weichteile (z.B. Zunge, Wangen, Lippen) betäubt sein, verzichten sie bitte, solange dieser Zustand anhält, auf die Nahrungsaufnahme. Neben Bißverletzungen sind auch Verbrennungen und Erfrierungen möglich.

## **Einverständniserklärung zur zahnärztlichen Lokalanästhesie**

- Die Aufklärung habe ich verstanden.                       Meine Fragen wurden zu meiner Zufriedenheit beantwortet.
- Ich möchte immer mit örtlicher Betäubung behandelt werden.                       Ich möchte nie mit örtlicher Betäubung behandelt werden.
- Ich möchte dies jeweils individuell entscheiden

Ich erkläre mich mit der elektronischen Speicherung, Bearbeitung und Nutzung meiner Daten zur Aufnahme in ein Recall-system einverstanden.

- Ja     Nein

Ich verpflichte mich, über alle Änderungen, die sich während der gesamten Behandlungszeit ergeben, umgehend Mitteilung zu machen. Desweiteren verpflichte ich mich, vereinbarte Behandlungstermine einzuhalten bzw. mindestens 24 Std. vor dem vereinbarten Termin abzusagen. Mir ist bekannt, dass nicht bzw. nicht rechtzeitig abgesagte Termine in Rechnung gestellt werden können.

---

Ort / Datum

---

Unterschrift